

آبله میمونی

علائم بیماری



کهیر



درد های عضلانی



سر درد



تب



تورم غدد لنفاوی



ضعف و بیحالی



کمر درد

راه های انتقال



وسایل شخصی



ظروف



ترشحات تنفسی



تماس پوستی با بیمار



لباس




رخت خواب



مادر به جنین

محل پدیدار شدن آبله ها



آبله میمونی

عوامل مرتبط با افزایش خطر عفونت عبارتند از:

- زندگی در مناطق جنگلی
- جنسیت مرد
- سن کمتر از ۱۵ سال
- عدم واکسیناسیون قبلی آبله

خطر ابتلا به آبله میمونی در افراد واکسینه شده ۵/۲ برابر کمتر از افراد واکسینه نشده بود (۷۸/۰ در مقابل ۴/۰۵ در هر ۱۰۰۰)



سر درد



کهیر



تورم غدد لنفاوی



درد های عضلانی



تب

📍 [healtheducation_zahedan](https://www.instagram.com/healtheducation_zahedan)
✉ zahedanhealthep@gmail.com
📌 t.me/healtheducation_zahedan



آبله میمونی

مقایسه با آبله مرغان و آبله

آبله میمونی

آبله مرغان

آبله

ویروس
۱-۵ روز پیش از جوش
اغلب بر صورت آغاز می شود و سپس به سایر مناطق از جمله کف دست و پا گسترش میابد سپس یک زخم تشکیل می دهد و از بین میرود
دارد
۵-۲۱ روز
۴-۲ هفته
۱۰ - ۱٪ موارد - بسته به سویه

ویروس
۱-۲ روز پیش از جوش
جوش خارش دار شبیه به تاول، ابتدا بر سینه، کمر، صورت و سپس در کل بدن گسترش میابد. بر کف دست و پا وجود ندارد
ندارد
۱۰-۲۱ روز
۴-۷ روز
نادر

ویروس
۲-۴ روز پیش از جوش
با نقطه های کوچک قرمز بر زبان و دهان آغاز میشود. سپس بر صورت پدیدار میشود و به بازوها و پاها و سپس کف دست و پا گسترش میابد. سپس یک زخم تشکیل میدهد و از بین میرود.
ندارد
۷-۱۹ روز
تا ۵ هفته
تا ۳۰٪ موارد ، بسته به گونه

عامل بیماری

بروز تب

ویژگی جوش

تورم غده های لنفاوی

زمان پیش از نشانه ها

دوره بیماری

مرگ و میر

healtheducation_zahedan
zahedanhealthp@gmail.com
t.me/healtheducation_zahedan