



(Ψ)

پژوهش اسلامی ایران
وزارت بهداشت، بهداشت و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰۲/۱۲۹۵۹
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر کمال حیدری

>/۴/۱۰۰۶۸
۹۱/۱۰/۱۲
(ک) ۲۰

معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

موضوع: در پاسخ به اصلاح دستورالعمل تجویز مکمل اسید فولیک مادران باردار

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۱/۷/۳ در مورخ ۹۱/۶/۴۶۸۳ تجویز اسید فولیک برای مادران باردار، ضمن تشکر از دقت نظر کارشناسان محترم آن معاونت به استحضار می‌رسد، بر اساس متون علمی، اسید فولیک مورد نیاز خانم باردار روزانه به میزان ۴۰۰ میکرو گرم است که انتظار می‌رود ۲۰۰ میکرو گرم آن از طریق تقدیه روزانه برآورده شود. مادرانی که در معرض خطر نیستند ۴۰۰ میکرو گرم به عنوان مکمل از سه ماه قبل از بارداری تا انتهای بارداری دریافت می‌نمایند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فرجهای موجود در بازار یک میلی گرمی است نیاز روزانه تامین می‌شود.

کسانی که سابقه نوزاد مبتلا به تقایص مادرزادی لوله عصبی، سابقه دیابت وابسته به انسولین، چاقی با BMI بالاتر از ۲۰ و داروهای ضد صرع نظیر کاربامازپین، والپروئیک اسید مصرف می‌کنند، در گروه پرخطر قرار دارند که می‌بایست روزانه ۵ میلی گرم اسید فولیک مصرف نمایند.

لازم است موارد زیر به عنوان توصیه‌های کلی به همکاران مراکز بهداشت درمانی گوشزد شود:

- به هر دلیلی که خانم در سنین باروری مراجعه می‌کند (انجام معاینات زنان و یا انجام تست پاپ اسمیر، معاینات پستان و پیشگیری و یا برنامه‌ریزی برای بارداری)، در مورد فواید اسید فولیک به او مشاوره داد.
- زنان در سنین باروری از مواد غذایی حاوی اسید فولیک نظیر اسفناج، کلم بروکلی، نخود سبز، ذرت، پرتقال، عدس، جوانه‌ها، کلم بروکسل و ... بیشتر استفاده نماید.

دکتر محمد اسعیل مطلن
مدیرکل رزوری سلامت صحت، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش